


ວິທີການຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການຮັກສາພະຍາດເບີ້າ ຫວານ

ຢາຮັກສາພະຍາດເບີ້າຫວານເປັນຢາເມັດທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານ ໃນເລືອດຫລຸດລົງໄປ. ຢາເມັດພວກນີ້ບໍ່ແມ່ນອິນຊີວລິນ

ບ່ອນຕ່າງໆ ທີ່ຢາຮັກສາພະຍາດເບີ້າຫວານຈະອອກລິດ

ເຊລກ້ອນຊິ້ນ
 ຢາຈຳພວກ **Thiazolidinediones**
 (Actos)(Avandamet)
 (Avandia)
 ເຮັດໃຫ້ກ້ອນຊິ້ນມີຄວາມ
 ກະຕຸ້ນຕໍ່ອິນຊີວລິນ
 ຫລາຍຂຶ້ນ

ມ້າມ
 ຢາຈຳພວກ
 (Prandin)
 Nateglinides
 (Starlix)
 ກະຕຸ້ນມ້າມໃຫ້ປ່ອຍອິນ
 ຊີວລິນຫລາຍຂຶ້ນ.



ມ້າມ
 ຢາຈຳພວກ
 (Glyburide, Glipizide, Amaryl)
 Exenatide (Byetta)
 ກະຕຸ້ນມ້າມໃຫ້ປ່ອຍອິນຊີວ
 ລິນຫລາຍຂຶ້ນ.

ຕັບ
 ຢາຈຳພວກ **Biguanides**
 (Glucophage)(Glucophage XR)
 (Avandamet) (Metformin)
 ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕັບປ່ອຍນ້ຳ
 ຕານອອກຫລາຍໄພດ.

ລຳໂສ້
 ຢາຍັບຍັ້ງຈຳພວກ **Alpha-Glucosidase**
 (Precose)
 (Glyset)
 Incretin (Symilin)
 ທຳໃຫ້ການຍ່ອຍຄາໂບໄຮ
 ເຖດບາງຊະນິດຊ້ຳລົງໄປ.



Lao - Treatments Used in Diabetes

Translation of this publication was supported by HRSA HCAP Grant # G92OA02204.

©2006 The Whittier Institute for Diabetes

Permission granted by The Whittier Institute for Diabetes to copy for patient education purposes. For additional information see www.whittier.org