

# Tìm Hiểu Về Thuốc Tiểu Đường



Lịch trình thuốc của quý vị có thể khác nhau khi nhập viện (hoặc giữa nhà và bệnh viện). Bạn nên kiểm tra lịch trình nhà của bạn với bác sĩ của bạn lúc xuất viện.

## Thuốc

LOẠI THUỐC VÀ TÊN	HOẠT ĐỘNG NHƯ THỂ NÀO	TÁC DỤNG PHỤ	NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ
GLUCOPHAGE (Metformin)	Hạn chế sự xuất tiết quá nhiều đường của gan	Có thể gây ra tiêu chảy, đau bụng quặn thắt và hơi.	Nếu bạn có đau phổi, thận, hoặc các vấn đề về gan, CHF hoặc suy tim sung huyết hoặc một trái tim bị suy yếu.
DIABETA (Glyburide) GLUCOTROL (Glipizide) AMARYL (Glimiperide)	Kích thích tuyến tụy để phát hành insulin nhiều hơn.	Hạ đường huyết, buồn nôn, nôn mửa và tăng cân.	Nếu bạn có đau gan hoặc vấn đề về thận hoặc dị ứng với thuốc sulfa.
JANUVIA (Sitagliptin) ONGLYZA (Saxagliptin) TRADJENTA (Linagliptin)	Hạn chế sự xuất tiết quá nhiều đường của gan	Nhức đầu, dạ dày đau bụng, tiêu chảy hoặc sổ mũi.	Nếu bạn có bệnh thận hoặc bệnh gan.
ACTOS (Pioglitazone) AVANDIA (Rosiglitazone)	Làm cho các tế bào cơ nhạy cảm hơn với insulin.	Hạ đường huyết, nhức đầu, sưng, tăng cân hoặc sưng mắt cá chân.	Nếu bạn có bệnh tim hoặc các vấn đề về gan. Có thể gây ra sưng mắt hoặc chân. Có thể làm tăng nguy cơ đau ngực hoặc đau tim.
PRECOSE (Acarbose) GLYSET (Miglitol)	Làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate.	Đau bụng quặn thắt và tiêu chảy.	Nếu bạn có đau dạ dày hoặc các vấn đề về gan.
PRANDIN (Repaglinide) STARLIX (Nateglinide)	Tăng số lượng insulin trong cơ thể.	Hạ đường huyết, tăng cân hoặc các triệu chứng giống như cúm.	Nếu bạn có đau thận, hoặc có vấn đề về gan. Tránh bưởi và nước bưởi.

# Insulin và Thuốc Chích Khác

## Insulin

LOẠI THUỐC VÀ TÊN	HOẠT ĐỘNG NHƯ THỂ NÀO	BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG	CÔNG TRÌNH MẠNH	EDS	HƯỚNG DẪN
APIDRA (Glulisine) HUMALOG (Lispro) NOVOLOG (Aspart)	Bolus Tác động nhanh	5-15 Phút	1-2 Giờ	4-6 Giờ	Màu trong suốt. Chích khi ăn.
Regular	Bolus Tác dụng ngắn	30-60 Phút	2-3 Giờ	6-8 Giờ	Màu trong suốt. Chích 30 phút trước bữa ăn.
NPH	Tác dụng trung bình	2-4 Giờ	6-10 Giờ	10-18 Giờ	Màu đục. Lăn nhẹ khi hòa tan. Chích theo chỉ định.
LANTUS (Glagine) LEVEMIR (Detemir)	Cơ bản tác dụng kéo dài	1-2 Giờ		Khoảng 24 Giờ	Màu trong suốt. Chích đúng giờ mỗi ngày. Không pha trộn với insulin khác.
50/50 and 70/30	Kết hợp Pre-Mix với thường xuyên	30-60 Phút	3-12 Giờ	12-20 Giờ	Màu đục. Lăn nhẹ khi hòa tan. Chích theo chỉ định.
75/25 and 70/30	Kết hợp Pre-Mix với Tác động nhanh	30-60 Phút	3-12 Giờ	12-20 Giờ	Màu đục. Lăn nhẹ khi hòa tan.. Chích theo chỉ định.

## Thuốc Chích Khác

LOẠI THUỐC VÀ TÊN	HOẠT ĐỘNG NHƯ THỂ NÀO	TÁC DỤNG PHỤ
BYETTA/BYDUREON (Exenatide) VICTOZA (Liraglutide)	Giúp tăng sản xuất insulin.	Buồn nôn, nôn Chán ăn Táo bón
SYMLIN (Pramlintide)	Giúp hạ thấp mức độ đường trong máu sau bữa ăn. Được sử dụng với insulin tại bữa ăn.	Buồn nôn, nôn Chán ăn